N°. 10

Rapport de deux observations communiquées à l'Académie par M. Lhéritier Prevot de l'école pratique de chirurgie.

La premiere observation a rapport a une fracture du col du femur parfaitement consolidée et accompagnée d'un epanchement de matiere du cal dans le bassin. C'est en dissequant les arteres du bassin d'un sujet agé de 50 ans, que M. Lhéritier a decouvert une eminence osseuse contenue dans l'epaisseur du muscle iliaque et qui s'étendoit jusque dans l'articulation du femur. avant d'ouvrir la capsule de cette articulation il a remarqué que la cuisse de le meme coté etoit plus courte que l'autre que le genou etoit tourné en dehors et que le grand trochanter etoit plus elevé et un peu plus en arriere. ces remarques lui firent présumer une fracture du col du femur, qu'il a ensuite reconnue d'une maniere sensible. cette fracture etoit à la base du col du femur, à son union avec le corps de cet os. elle etoit oblique, en partie dans l'interieur de la capsule et en partie au dehors, j'ai ~~[illegible]~~ sur la piece anato=mique qu'il a présentée à l'Académie l'état des parties dont il fait mention dans son observation et je l'ai trouvé exact et juste. Pour connoitre l'état du col j'ai scié la tete du femur suivant la longueur de l'os et j'ai remarqué dans le lieu de la consolidation une substance osseuse tres solide et compacte, et qui a offert beaucoup de resistance à la scie. la Maceration continuée pendant six semaines et l'ebullition n'y ont point produit de changement. quant à la production osseuse, elle s'étend depuis l'interieur de l'article auprès du petit trochanter jusque dans le bassin en suivant la direction de l'iliaque. elle est un composé de substance compacte et cellulaire. il me paroit comme à M. Lhéritier que l'ouverture de la capsule a permis cet epanchement de sucs osseux au dehors et qu'il a été dirigé du coté du bassin à cause de la resistance qu'offre du coté inferieur l'in=

ARC 58 n° 12

sertion des muscles au petit trochanter. cette observation presentant un fait tres curieux et donnant une preuve de la consolidation des fractures du col du femur à sa base près le commencement du corps de l'os mérite d'etre conservée.

La seconde observation est aussi interessante. elle traite d'une tumeur lymphatique qu'une femme portoit depuis huit mois au genou du coté droit. L'inefficacité de differens remedes employés soit pour le resoudre, soit pour en empecher l'accroissement, soit pour diminuer les douleurs vives qu'elle excitoit, determina a faire l'amputation de la cuisse. c'étoit la seule ressource apparente pour conserver la vie de la malade. M. L'héritier a disséqué la partie malade et a vu un amas considerable d'~~[illegible]~~ plus ou moins consistente situé en partie sur la face anterieure du femur et en partie dans l'interstice des muscles. les condyles de cet os dont le volume n'étoit point augmenté, au lieu d'etre spongieux ou cellulaire étoient ~~d'une~~ tres compactes et d'une dureté semblable à celle du milieu de cet os. M. L'héritier a repeté les experiences de Mrs. Quesnay et Dufouart pour connoitre la nature de cette matiere. ~~et la trouva~~ elles lui ont appris qu'elle etoit principalement formée par une humeur lymphatique. M. L'héritier rend compte des suites de l'operation. La malade qui l'avoit supporté avec beaucoup de courage se trouva tres bien pendant huit jours. ensuite la scène a changé. elle eut plusieurs accès de fievre avec frisson. la suppuration qui avoit été louable et abondante diminua, devint sereuse. le devoyement augmenta et elle mourut le 12e. jour après l'amputation. M. L'héritier a disséqué le moignon, a vu une infiltration sanguinolente dans l'epaisseur des triceps auprès de la ligature, laquelle pouvoit etre produite par l'ouverture de petits vaisseaux avec l'aiguille qui a passé les fils. il a trouvé un caillot dans l'interieur de l'artere auprès de la ligature; ce qui confirme encore le sentiment de M. Petit

j'ai desiré connoitre l'état ~~du~~ de la portion du fémur qui formoit le moignon,
par la section ~~on a fait~~ voir que la moelle étoit en suppuration.
j'ai pensé que le fait dont on ~~en~~ trouve ~~que~~ à peine des exemples
dans les observateurs méritoit d'être présenté à l'Académie. j'ai
montré ~~avec~~ cette pièce dans la séance du 9 decembre dernier.
on a vu une véritable matière purulente, épaisse, consistante
inodore, semblable à du pus louable. le tissu reticulaire qui est
très abondant dans l'intérieur de cet os étoit presque entièrement
détruit. je présume que cette suppuration s'est formée après
l'amputation, qu'il y avoit une disposition inflammatoire dans
la moelle avant l'opération, ou même une véritable inflammation
dont on pouvoit avoir en quelques symptomes d'après les douleurs extrêmes
que la femme ressentoit dans la cuisse. la fièvre avec frisson et
le dévoyement qui ont duré quelques jours avant la mort
semblent annoncer qu'il y a eu reflux de matière purulente:
et peut-être cette cause, la suppuration de la moelle produit-elle
assez souvent la mort des amputés. ~~de~~
il me paroit que l'observation de M. L'héritier dont les objets
sont exposés avec beaucoup de clarté et de methode ~~est~~ et digne
d'être accueillie par l'Académie, et qu'elle pourra en faire
usage quand elle traitera cette matière.

Chopart

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE